

جراحی عوارضی ممکن است رخ دهد . لخته شدن خون در رگ ها ، عفونت ، خونریزی شدید و واکنش حساسیت به داروهای بیهوده ای، برخی از شایع ترین عوارض جراحی هستند. عوارض احتمالی دیگر نیز عبارتند از :

- آسیب مجاری ادرار، مثانه یا مقعد در طول جراحی که ممکن است برای ترمیم آن ، به جراحی اضافی نیاز پیدا شود.
- فقدان عملکرد طبیعی تخدمان ، باعث کاهش سطح استروژن و خشکی واژن می شود .
- شروع زودرس علایم یائسگی به دلیل برداشت تخدمان
- تشکیل بافت اسکار و چسبندگی های داخل شکمی

سزارین هیسترکتومی


گاهی اوقات ممکن است بالافاصله پس از سزارین نیاز به هیسترکتومی پیدا شود. این موارد شامل اورژانسی و غیر اورژانسی است.

موارد اورژانسی سزارین هیسترکتومی عبارتند از :

- خونریزی های غیر قابل کنترل (پارگی رحم - آتونی رحم - جفت سر راهی - اختلالات انعقادی) و عفونت رحمی. در این موارد اگر قصد نگهداری رحم وجود داشته باشد، بایستی تا حد امکان با اقدامات غیر جراحی (ماساز دودستی / اکسی توسین / پروستاگلاندین / تجویز خون) و یا بستن شریانهای اصلی خون رساننده به رحم سعی در کنترل خونریزی نمود در صورت عدم موفقیت روش های فوق، هیسترکتومی برای

سرطان در سیستم تناسلی زنانه : با توجه به نوع سرطان و میزان پیشرفت آن، ممکن است قبل از هیسترکتومی راه های جایگزین شامل هورمون درمانی یا پرتو درمانی نیز به کار برد شود .


فیبروم های رحم : هیسترکتومی تنها راه حل دائمی برای فیبروئید است . فیبروئیدها، تومورهای خوش خیم رحم هستند که منجر به خونریزی مکرر، کم خونی، درد لگن و فشار بر روی مثانه می شوند . فیبروئید بیماری شایعی است که ممکن است بسته به اندازه و شدت علائمی که ایجاد می کند ، بتوان با راه هایی غیر از جراحی نیز آن را درمان کرد . در این بیماری بافت پوشاننده داخل رحم در خارج از رحم، مثلا در تخدمان ها، لوله های رحمی یا لگن رشد می کند و همانند یک رحم معمولی ، موجب درد و خونریزی های نامنظم می شود . در این بیماری هم اگر دارو و درمان های دیگر جواب ندهد ، شاید نیاز به هیسترکتومی باشد .



خطرات عمل جراحی چیست؟

هیسترکتومی معمولاً بسیار بی خطراست . اما در هر عمل

هیسترکتومی عمل جراحی است که در آن رحم برداشته می شود و هیسترکتومی توقال شامل برداشتن رحم و دهانه رحم است که در بسیاری موارد انجام می شود. علاوه بر سرطان برای سایر اختلالات مثل خونریزی غیر طبیعی، آندومتریوز، رشد غیر سرطانی رحم ، رشد غیر سرطانی دهانه رحم ، مشکلات مریبوط به شل شدن عضلات کف لگن، پرولاپس و صدمات وارد به رحم نیز هیسترکتومی کامل انجام می شود . البته در اغلب موارد ، هیسترکتومی، برای درمان گروهی از بیماری های زنان است که به درمان دارویی پاسخ خوبی نداده اند . در ضمن ، این روش برای خانم هایی می تواند مطلوب باشد که دیگر قصد بچه دار شدن ندارند و از به کار بردن درمان های بی نتیجه و متعدد هم خسته شده اند .



چرا هیسترکتومی انجام می شود ؟

معمولا هیسترکتومی اولین گزینه درمانی نیست ، اما اگر شما دچار مشکل خاصی باشید و درمان های دیگر موفقیت آمیز نباشد ، ممکن است مجبور به خارج کردن رحم خود شوید.

برخی از شایع ترین این مشکلات عبارتند از :

نجات جان مادر ضروری است.

موارد غیر اورژانسی سزارین عبارتند از :

هیسترکتومی عمدها مربوط به رشد بیش از حد سلولهای رحم یا دهانه رحم مثل بدخیمی ها - میوم بزرگ و اختلال رشد سلولهای دهانه رحم می شود.

بعد از عمل چه نکاتی را باید رعایت کنید؟

۱- از بلند کردن اشیاء و اجسام سنگین و فشار آوردن بر موضع عمل تا ۶ هفته خودداری کنید و تا هنگامی که پزشکتان صلاح ندانسته از مقاربت پرهیز نمایید.

۲- استحمام از روز دوم بعد از عمل و بلا فاصله بعد از برداشتن پانسمان به صورت روزانه انجام می گیرد و بهتر است بعد از حمام محل عمل با سشووار خشک شود.


۳- سیکل قاعدگی بعد از هیسترکتومی قطع می شود، اما ممکن است کمی خونریزی از رحم برای چند روز داشته باشید ولی چنانچه این خونریزی ادامه پیدا کرد یا بعد از مدتی تکرار شد بلا فاصله باید گزارش نمایید.

۴- برای پیشگیری از بیوست، آب و مایعات به مقدار کافی مصرف کنید. در چند روز اول از خوردن غذاهای نفخ پرهیز کنید و غذاهای سبک در حجم کم مصرف کنید.

۵- شما به سرعت بهبود پیدا می کنید، خستگی و کوفتگی



عمل هیسترکتومی توتال چیست؟



بیمارستان گلدیس شاهین شهر - واحد آموزش به بیمار

تهیه و تنظیم: مریم قیطاسی وند - کارشناس مامائی

پائیز ۱۳۹۲ - کد پمفت: ۰۱ - AW7

بعد از عمل وجود دارد و غیرمعمول نیست.

۶- ترجیحاً از توالت فرنگی استفاده کنید.

۷- از نشستن طولانی مدت و عدم تحرک خودداری کنید.

چون موجب تجمع خون و رکود خون داخل لگن می شود.

۸- دوش گرفتن بهتر از حمام وان است ، زیرا خطر بروز

عفونت را کاهش داده و از صدمه احتمالی هنگام ورود و

خروج از وان نیز جلوگیری می شود .

۹- برای جلوگیری از لخته شدن خون در پاها از جوراب

لاستیک استفاده کنید .

۱۰- اطمینان داشته باشید که هنوز واژن شما دست نخورده

است لذا برقراری ارتباط جنسی بعد از دوره‌ی منع رابطه بعد

از عمل، مشکلی نخواهد داشت .



۱۱- در صورت مشاهده ترشحات

چرکی از واژن همراه با بوی تعفن،

خونریزی، طپش قلب و افت شدید

вшارخون، اسهال، درد پهلوها، بیرون

زدگی توده از محل عمل، وجود خون در ادرار، هرگونه درد

شدید شکم، هر گونه ترشح چرکی، قرمزی و یا التهاب محل

عمل و هر گونه قرمزی پاها و التهاب به پزشک مراجعه

کنید .

منبع: کتاب داخلی جراحی - بروونر سودارت ۲۰۰۸

سایت بیمارستان: www.goldis.mui.ac.ir