

بیمار عزیز به دلیل ایمنی پایین، شما نیاز به تزریق واکسن دارید و تزریق بعضی از واکسن ها برای شما الزامی می باشد.

این واکسن ها شامل :

واکسن آنفلوانزا

واکسن پنوموکوک

واکسن هپاتیت B



واکسیناسیون معمول شامل :

واکسن سرخک - اوریون - دیفتتری - کزاز و سیاه سرفه (سه

گانه) طبق برنامه واکسیناسیون کشوری انجام می شود.

توصیه می شود قبل از انجام هر نوبت واکسیناسیون با پزشک خود مشورت کنید.

هنگام مراجعه به مرکز واکسیناسیون، دیالیزی بودن خود را به مسئول مربوطه اطلاع دهید.

واکسن آنفلوانزا

همان واکسن سرماخوردگی می باشد که بدلیل ایمنی پایین در بیماران دیالیزی باید تزریق گردد. زمان تزریق آن اوایل پاییز می باشد و تاثیر ایمنی آن بمدت شش ماه می باشد.

بیماران دیالیزی هر سال باید این واکسن را تزریق کنند. در اطفال با سن بیشتر از شش ماه می توان این واکسن را تزریق کرد. واکسن آنفلوانزا بصورت زیر جلدی یا عضلانی (ناحیه عضله دلتوئید در بزرگسالان و ناحیه قدامی خارجی ران در کودکان) می باشد.

مقدار واکسن در بالغین و کودکان بالای ۱۳ سال یک دوز ۰/۵ میلی لیتری می باشد.

واکسن پنوموکوک

این واکسن جهت پیشگیری از عفونت پنوموکوک (پنومونی یا عفونت ریه) تزریق می شود در کودکان با سن بالاتر از دو سال تزریق می شود و در بیماران دیالیزی هر سه تا پنج سال یکبار تکرار می شود.

در موقع تزریق عوارض خفیفی مثل درد، قرمزی، خارش و سوزش در محل تزریق ممکن است بروز کند .



واکسن هپاتیت B

بیماران دیالیزی باید قبل از واکسیناسیون از نظر هپاتیت (HBSAg و HBSAb) بررسی شوند. اگر سطح آنتی بادی در



واکسیناسیون در بیماران دیالیزی



تهیه کننده: صدیقه کمانی - سوپروایزر آموزش سلامت

مشاور علمی: خانم دکتر نوشین هاشمی

بهار ۱۴۰۴ کد پمفلت AW4-06



خون (HBSAb) زیر ۱۰ باشد بیمار مستعد به هپاتیت می باشد و در صورت منفی بودن HBSAg در سه نوبت یا ۴ نوبت با دوز دوبرابر، واکسن در یافت می کنند و بعد از آخرین تزریق واکسن یک الی دو ماه بعد تیتر آنتی بادی چک شده و در صورت پایین بودن تیتر آن، مجدداً واکسن تزریق می شود، در صورت بالا بودن تیتر آنتی بادی که نشانه اثر گذاری واکسن می باشد این تیتر سالیانه چک می شود.

کلیه بیماران دیالیزی باید کارت واکسیناسیون داشته باشند و بیمارانی که احتیاج به تزریق واکسن هپاتیت B دارند باید دقت کامل به تاریخ های نوشته شده در کارت خود را داشته باشند و در تاریخ های نوشته شده به مرکز مربوطه که اکثراً در همان مرکزی که دیالیزی شوند مراجعه و واکسن تزریق کنند در بیماران دیالیزی واکسن هپاتیت در چهار دوز ۰ و ۱ و ۲ و ۱۲ ماه تزریق می شود در همه مراکز دیالیز تیتر آنتی بادی هپاتیت B به طور سالیانه چک می شود و در صورت پایین بودن آن، پرسنل شما را جهت تزریق مجدد واکسن راهنمایی می کنند.

منابع: کتاب دیالیز و پرستاری، اداره پیوند و بیماریهای

خاص

سایت بیمارستان: www.goldis.mui.ac.ir