

واکسیناسیون

واکسن از باکتری یا ویروس زنده ضعیف شده و یا غیر فعال شده و یا جزیی از آنها ساخته شده است.

بادریافت واکسن، سیستم ایمنی بدن علیه باکتری یا ویروسی که وارد بدن می شود، آنتی بادی ساخته و باعث بالا بردن مصونیت بدن در مقابل بیماری ناشی از آن می شود.



برنامه واکسیناسیون کشوری ایران برای کودکان از بدو تولد بصورت زیر تعیین شده است.

برنامه	واکسن
بدو تولد	ب ث ژ، هپاتیت ب ، فلج اطفال خوراکی
۲ ماهگی	فلج اطفال خوراکی-پنج گانه روتا ویروس - پنوموکوک
۴ ماهگی	فلج اطفال خوراکی-پنج گانه فلج اطفال تزریقی - روتا ویروس - پنوموکوک
۶ ماهگی	فلج اطفال خوراکی-پنج گانه فلج اطفال تزریقی - روتا ویروس - سرخک
۱۲ ماهگی	پنوموکوک-MMR

واکسن نزدن به کودک چه خطری دارد ؟

واکسن نزدن کودکان سبب ایمن نشدن آن ها در برابر بیماری ها و خطر بالای ابتلا به آنها می شود. از طرف دیگر این افراد علاوه بر تحمل رنج بیماری و عوارض آن، سبب انتشار بیماری در جامعه و تهدید سلامت دیگران خواهند بود، به همین علت باید همه خانواده ها را به واکسیناسیون به موقع تشویق کرد .

آیا یکبار واکسن زدن کودک کافی است ؟

خیر ، فقط واکسن سل یکبار زده می شود ، بقیه واکسن ها برای این که بتوانند ایمنی مناسب در کودک ایجاد کنند باید چند بار و طبق برنامه توصیه شده تزریق شوند .

نکاتی در رابطه با واکسینا سیون بدو تولد

*قطره فلج اطفال

*واکسن فلج اطفال خوراکی حاوی ویروس زنده ضعیف شده می باشد که در هر نوبت ۲ قطره در دهان کودک چکانده می شود.

*در صورت استفراغ نوزاد در کمتر از ۳۰ دقیقه بعد از دریافت قطره فلج اطفال ، تجویز قطره باید تکرار شود.

*اگر کودکی مبتلا به اسهال شدید باشد و همزمان قطره فلج اطفال به او تجویز شود ، باید یک نوبت اضافی واکسن با فاصله حداقل یک ماه دریافت نماید.

*تجویز قطره فلج اطفال خوراکی در کودکان مبتلا به عفونت HIV، نقص سیستم ایمنی، تحت درمان با اشعه و مبتلایان به سرطان ممنوع می باشد.

*در صورت بروز واکنش حساسیت شدید به دنبال نوبت قبلی واکسن قطره فلج اطفال، تجویز دزهای بعدی ممنوع است.

*در صورت سابقه نقایص سیستم ایمنی در فرزندان قبلی خانواده ، یا وجود فردی در خانواده که نقص سیستم ایمنی دارد ، تجویز قطره فلج اطفال ممنوع می باشد تا بررسی گردد.

*واکسن سل (ب ث ژ)

*واکسن ب.ث.ژ باسیل زنده ضعیف شده می باشد.

*محل واکسن ب-ث-ژ ممکن است دو سه هفته بعد از تزریق شروع به زخم شدن و چرک کردن بکند که احتیاج به مراجعه به پزشک و استفاده از دارو نمی باشد مگر در موارد شدید که باید به پزشک مراجعه کنید.

*به هیچ وجه جای واکسن فشار داده نشود.

*از گذاشتن حوله ، کیف آب گرم ، لیف و هر نوع ماده دیگر بر روی محل واکسن جدا خودداری شود.

*حمام دادن نوزاد بعد از واکسینا سیون ممنوعیتی ندارد .

*تلقیح ب.ث.ژ در کودکان مبتلا به نقص سیستم ایمنی، یادر صورت سابقه نقایص سیستم ایمنی در فرزندان قبلی خانواده ممنوع می باشد.

*تلقیح این واکسن در شیرخواران نارس با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم با نظر پزشک متخصص اطفال انجام می گیرد.

*واکسن هپاتیت

*واکسن هپاتیت ب، واکسن نو ترکیب انتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب است.

*واکسیناسیون هپاتیت برای کلیه نوزادان از جمله شیرخواران کم وزن و نارس، در ۲۴ ساعت ابتدایی تولد انجام می گیرد.

*در صورت بروز واکنش حساسیت شدید به دنبال نوبت قبلی واکسن هپاتیت، تجویز دزهای بعدی ممنوع است.



بعد از انجام واکسیناسیون کودک چه باید کرد

*درباره علائم حساسیت کودک به واکسن، اطلاعات مناسبی را کسب کنید. این اطلاعات سبب می شود تا شما به محض مشاهده این گونه علائم در کودک خود، به پزشک او اطلاع داده و مراقبت های لازم را انجام دهید. تنگی نفس، خس خس سینه، شلی بدن، اسهال، استفراغ خشکی دهان، کهیر منتشر، خارش، بثورات جلدی از جمله عوارضی می باشد که می تواند پس از تزریق واکسن به کودک ظاهر شود.

*پس از تزریق واکسن، حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در درمانگاه صبر کنید تا در صورت شروع شدن واکنش های آلرژی زا در کودک، سریعاً او را نزد پزشک ببرید. در برخی موارد واکنش های جدی در کودک رخ می دهند که سریعاً نیاز به اقدامات درمانی توسط پزشک دارد و ممکن است هرگونه تاخیر در شروع اقدامات درمانی منجر به فوت زمان شده و کودک را با مشکلات جدی سلامتی روبرو سازد.

در صورت بروز علائم حساسیت کودک به واکسن

*این واکنش ها به صورت بسیار نادر پس از واکسیناسیون اتفاق می افتد.

*این علائم از چند دقیقه تا چند ساعت ممکن است به دنبال واکسیناسیون اتفاق بیافتد.

*هرگز نباید فرد را تنها گذاشت.

*تماس فوری با اورژانس ۱۱۵

*فرد را در وضعیت خوابیده به پشت و پاهای وی را بالا نگه دارید.

*در صورت استفراغ یا خون ریزی از دهان یا انسداد مجاری فوقانی تنفسی، فرد را به پهلو بخوابانید.



شناسنامه پمفلت آموزشی	
راهنما و مراقبت های واکسیناسیون بدو تولد	عنوان
مژگان انصاری واکسیناتور بیمارستان	تهیه و تدوین
برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوبه کمیته کشوری ایمن سازی	مشاور علمی
اردیبهشت ۱۴۰۴	سال تهیه
AW5-28	کد پمفلت
www.goldis.mui.ac.ir - بیمارستان گلدیس شاهین شهر	